

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かぜムテキ

総合かぜ薬

第2類医薬品

〔特 徴〕

- ・各成分がバランスよくはたらき、のどの痛み、鼻水、せきなどのかぜの諸症状の緩和に効きめをあらわす総合感冒薬です。
- ・解熱鎮痛成分としてアセトアミノフェン等を配合して発熱、悪寒、関節や筋肉の痛みをおさえます。
- ・クロルフェニラミンマレイン酸塩が鼻づまりなどを和らげ、dl-メチルエフェドリン塩酸塩が気管支をひろげ、チペピジンヒベンズ酸塩がせき中枢にはたらいてせきを鎮めます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
- 1.次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
 - 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
 - 4.服用時は飲酒しないでください。
 - 5.長期連用しないでください。



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
 - (5)高齢者。
 - (6)本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (7)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
 - 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれます。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれます。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれます。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれます。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

口のかわき

【効能又は効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

【用法及び用量】

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15才以上	2 カプセル	3 回
8才以上15才未満	1 カプセル	
8才未満	服用しないこと	



<用法及び用量に関連する注意>

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)カプセルの取り出し方

〈PTPシートの取り出し図〉

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分及び分量】

6カプセル中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	660mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
エテンザミド	400mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水・鼻づまり・くしゃみを和らげます。
チベピジンヒベンズ酸塩	65mg	せき中枢にはたらき、せきを鎮め、また、たんを取り去る作用もあります。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支をひろげ、せきを和らげます。
無水カフェイン	120mg	頭痛を和らげます。
ショウキョウ末	133.5mg	芳香辛味健胃作用があります。また、かぜの症状を和らげます。

添加物としてカルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色5号、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、カルナウバロウを含有する。

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。



お客様相談窓口 明治製薬株式会社 TEL 076-476-1111
9:00～16:30(土、日、祝祭日は除きます。)



製造販売元
明治製薬株式会社
富山県滑川市中川原77