

かぜユーシン

項目	内容
医薬品区分	一般配置兼用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
製品名	かぜユーシン
製品名(読み)	カゼユーシン
製品の特徴	かぜユーシンは、発熱、せき、鼻づまりなどのかぜのいろいろな症状にお使いいただける総合感冒薬です。
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)服用前後は飲酒しないでください長期連用しないでください <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)授乳中の人。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱, 排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害, 糖尿病, 心臓病, 高血圧, 肝臓病,
腎臓病, 胃・十二指腸潰瘍, 緑内障

2. 服用後, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに服用を中止し, この説明書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位: 症状]

○皮膚: 発疹・発赤, かゆみ

○消化器: 吐き気・嘔吐, 食欲不振

○精神神経系: めまい

○泌尿器: 排尿困難

○その他: 過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称: 症状]

○ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに, 皮膚のかゆみ, じんましん, 声のかすれ, くしゃみ, のどのかゆみ, 息苦しさ, 動悸, 意識の混濁等があらわれる。

○皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群), 中毒性表皮壊死融解症, 急性汎発性発疹性膿疱症: 高熱, 目の充血, 目やに, 唇のただれ, のどの痛み, 皮膚の広範囲の発疹・発赤, 赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る, 全身がだるい, 食欲がない等が持続したり, 急激に悪化する。

○薬剤性過敏症症候群: 皮膚が広い範囲で赤くなる, 全身性の発疹, 発熱, 体がだるい, リンパ節(首, わきの下, 股の付け根等)のはれ等があらわれる。

○肝機能障害: 発熱, かゆみ, 発疹, 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる), 褐色尿, 全身のだるさ, 食欲不振等があらわれる。

○腎障害: 尿量減少, 発熱, 発疹, 全身のむくみ, 全身のだるさ, 関節痛(節々が痛む), 下痢等があらわれる。

○間質性肺炎: 階段を上ったり, 少し無理をしたりすると息切れがす

	<p>る・息苦しくなる, 空せき, 発熱等がみられ, これらが急にあらわれたり, 持続したりする。</p> <p>○ぜんそく: 息をするときゼーゼー, ヒューヒューと鳴る, 息苦しい等があらわれる。</p> <p>○再生不良性貧血: 青あざ, 鼻血, 歯ぐきの出血, 発熱, 皮膚の粘膜が青白くみえる, 疲労感, 動悸, 息切れ, 気分が悪くなりくらっとする, 血尿等があらわれる。</p> <p>○無顆粒球症: 突然の高熱, さむけ, のどの痛み等があらわれる。</p> <p>3. 服用後, 次の症状があらわれることがありますので, このような症状の持続又は増強が見られた場合には, 服用を中止し, この説明書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p style="padding-left: 40px;">口のかわき, 眠気</p> <p>4. 5~6 回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し, この説明書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>										
<p>効能・効果</p>	<p>かぜの諸症状(鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和</p>										
<p>用法・用量</p>	<p>次の量を, 1 日 3 回, 食後なるべく 30 分以内に服用してください。</p> <p>[年齢: 1 回量]</p> <p>○ 成人(15 才以上): 1 包</p> <p>○ 11 才以上 15 才未満: 2/3 包</p> <p>○ 7 才以上 11 才未満: 1/2 包</p> <p>○ 3 才以上 7 才未満: 1/3 包</p> <p>○ 3 才未満: 服用させないこと</p>										
<p>用法関連注意</p>	<p>(1) 用法・用量を厳守してください。</p> <p>(2) 小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>										
<p>成分分量</p>	<p>3 包(3g)(成人 1 日量)中</p> <table border="1" data-bbox="448 1704 1002 1989"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900mg</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>7.5mg</td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>30mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>150mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	無水カフェイン	150mg
成分	分量										
アセトアミノフェン	900mg										
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg										
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg										
無水カフェイン	150mg										

添加物	リン酸水素カルシウム, バレイショデンプン, セルロース, 乳糖, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム, 黄色 4 号(タートラジン)
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4) 1 包を分割した残りを服用する場合には, 袋の口を折り返して保管し, 2 日以内に服用してください。 (5) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。
消費者相談窓口	問い合わせ先:くすり相談窓口 電話:076-435-5055 受付時間:午前 9 時から午後 4 時 30 分まで(土, 日, 祝日を除く)
製造販売会社	第一薬品工業株式会社 〒931-8515 富山県富山市草島 15-1
剤形	散剤
リスク区分等	第「2」類医薬品