

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

かぜ薬

鼻水・せき・のどの痛みに

# アナクール竜宝G

## 製品の特徴

アナクール竜宝Gは、鼻水、鼻づまり、のどの炎症などの症状にはたらく漢方薬「小青竜湯エキス」に、鼻水、のどの痛み、発熱などのかぜの諸症状を和らげる5つの成分を配合したかぜ薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

#### 1. 次の人は服用しないこと。

1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)。

#### 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと(眠気があらわれることがある)。

#### 4. 服用時は飲酒しないこと。

#### 5. 長期連用しないこと。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること。

1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。

2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

3) 高齢者。

4) 本人または家族がアレルギー体質の人。

5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難。

7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障。

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。

1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)などがあらわれる。
間質性肺炎*	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあります。空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)*
ぜんそく	

#### 2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合。

#### 3. 次の症状があらわれるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。

口のかわき。

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	900mg	炎症を抑え、発熱、頭痛・関節の痛みなどを緩和します。
d-マレイン酸クロルフェニラミン	3.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状を緩和します。
ヒベンズ酸チペビジン	75mg	せきを抑え、たんを出しやすくします。
無水カフェイン	150mg	頭痛を緩和します。
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg	たんを出しやすくします。
小青竜湯エキス	1335mg (原生葉として 8010mg相当量)	鼻水、鼻づまり、のどの炎症などの諸症状を和らげます。

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、リン酸水素Ca、ヒドロタルサイトを含有する。

### 用法用量

次の1回量を1日3回 食後なるべく30分以内に服用する。

年 令	1回量
成人（15才以上）	1包
11才以上 15才未満	2/3包
7才以上 11才未満	1/2包
3才以上 7才未満	1/3包
3才未満	服用しないこと

### 〈用法用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 効能効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

### 保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

### 〔問い合わせ先〕

- 購入した薬局・薬店
- 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987  
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時  
(土・日・祝日を除く)



製造販売元  
**日水製薬株式会社**  
東京都台東区上野3-23-9