

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かぜに

カゼブ。ロカスセルS

第2類医薬品

総合かぜ薬

〔特 徴〕

- ・各成分がバランスよくはたらき、のどの痛み、鼻水、せきなどのかぜの諸症状の緩和に効きめをあらわす総合感冒薬です。
- ・解熱鎮痛成分としてアセトアミノフェン等を配合して発熱、悪寒、関節や筋肉の痛みをおさえます。
- ・クロルフェニラミンマレイン酸塩が鼻づまりなどを和らげ、dl-メチルエフェドリン塩酸塩が気管支をひろげ、ジヒドロコデインリン酸塩がせき中枢にはたらいてせきを鎮めます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1)医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)本人または家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvens-ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(裏面へ続く)

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
便秘、口の渇き

〔効 能〕

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

〔用法・用量〕

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上（成人）	2 カプセル	3 回
7 歳～14歳	1 カプセル	
7 歳未満	服用しないこと	



＜用法・用量に関連する注意＞

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2)用法・用量を厳守すること。

(3)カプセルの取り出し方

＜PTPシートの取り出し図＞

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。(誤ってそのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



〔成 分〕

6 カプセル(成人の1日服用量)中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	780mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
地竜エキス散	200mg (原生薬400mg)	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水・鼻づまり・くしゃみを和らげます。
ジヒドロコデインリン酸塩	18mg	せき中枢にはたらき、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきを和らげます。
無水カフェイン	75mg	頭痛を和らげます。
ゴオウ	3mg	炎症をおさえます。

添加物として、パレイシヨデンプン、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、黄色5号、酸化チタンを含有する。

〔保管および取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。

(4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。



お客様相談窓口 明治製薬株式会社 TEL 076-476-1111

9:00～16:30(土、日、祝祭日は除きます。)



発売元
大和中央製薬株式会社
奈良県橿原市北八木町1丁目6番16号



製造販売元
明治製薬株式会社
富山県滑川市中川原77