

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

“ゴオウ・ビタミンB₁誘導体配合”

(かぜ薬)

カゼワンK錠

第②類医薬品

特 徴

カゼワンK錠は、発熱、頭痛、関節の痛みをやわらげるアセトアミノフェン、鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状に効果のあるクロルフェニラミンマレイン酸塩、せきを鎮めるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、たんんの排泄を促進するチペピジンヒベンズ酸塩、頭痛をやわらげる無水カフェイン、かぜの発熱時に消耗されやすいビタミンの補給にビタミンB₁、B₂などを配合した飲みやすい錠剤(糖衣錠)タイプのかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと。

5. 長期連用しないこと。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、腎臓病、高血圧、心臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

(裏面に続く)

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい 症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があら われる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、 発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と 区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化し た場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受け ること。)
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた
場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関
節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	15才以上	11才以上15才未満	11才未満
1 回 量	2錠	1錠	服用しないこと
服用回数	1日3回		

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出
してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故
につながります。)

成分・分量 1日量(6錠中)

成 分	分 量	成 分	分 量
アセトアミノフェン	900mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
チペピジンヒベンズ酸塩	50mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg
無水カフェイン	100mg	チアミンジスルフィド(ビタミンB ₁ 誘導体)	10mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	3mg	ゴオウ(牛黄)	3mg

添加物として、バレイショデンブ、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、
ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、アラビアゴム、ポビドン、酸化チタン、白糖、カルナウ
バロウを含む。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 配置期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555

受付時間 10:30～15:00(土、日、祝日を除く)

お客様相談室へ

製造販売元



至誠堂製薬株式会社

〒639-2241 奈良県御所市茅原220-1

Ⓒ KL-2