

キクアカダマ

登録



商標

・ : かぜぐすり : ・

コウドン[®] (W)

KODON (W)

株式会社 赤玉堂

第②類医薬品

かぜぐすり

ゴウドン[®] (W)

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

【用法・用量】

15才以上（成人）1回 1包 11才以上15才未満1回 $\frac{2}{3}$ 包
8才以上11才未満1回 $\frac{1}{2}$ 包 5才以上8才未満1回 $\frac{1}{3}$ 包
いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用する。

* (1)用法及び用量を厳守すること。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(3)5才未満の乳幼児には、服用させないこと。

【成分・分量】

1日量3包(1包1g)中
サリチルアミド 990mg ジヒドロコデインリン酸塩 15mg
アセトアミノフェン 600mg d,l-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg
無水カフェイン 90mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg
添加物としてバレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、
黄色4号(タートラジン)を含有する。

1. 次の人は服用しないこと

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

4. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと

6. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

7. 配置期限経過後は服用しないこと



K

2包(1g×2)入 ¥300.

製造販売元 株式会社 赤玉堂 奈良県橿原市曲川町2丁目7-13 TEL0744-22-0269

第②類医薬品

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

平成24年6月

この使用上の注意は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

△ コウドン(W) 使用上の注意

第②類医薬品

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること 5. 服用前後は飲酒しないこと 6. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難(7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

関係部位	症 状
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなったりする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には袋の折り口を折り返して保管し2日以内に服用すること。(5)配置期限経過後は服用しないこと。

製造販売元 (株) 赤 玉 堂 連絡先電話番号 ☎0744-22-0269