

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

かぜの諸症状緩和に総合感冒薬

牛黄・桔梗・甘草 配合

シンピタ®エース

本剤は、古くからかぜ薬として重宝されてきた漢方生薬の、ゴオウ（牛黄）、地竜、桔梗、甘草に、西洋薬を配合した総合感冒薬のカプセルです。

かぜは万病のもとと言われますが、薬を服用するだけでなく、出来るだけ早期に保温や安静に留意して、正しい治療をお願い致します。

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（眠気があらわれることがあります。）
- 服用時は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児（7歳以上15歳未満）。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群） 中毒性表皮壊死症 （ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。）
ぜんそく	

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき

【成分・分量】

成 分	分量 1日量(6カプセル)中	作 用
ゴオウ（牛黄）	10mg	熱を下げる効果のある生薬です。
ジリュウ乾燥エキス (原生薬として400mg)	52mg	
キキョウ乾燥エキス (原生薬として540mg)	54mg	咳を鎮めたんを除き、のどの痛みをやわらげる効果があります。
カンゾウ乾燥エキス (原生薬として670mg)	134mg	咳を鎮めたんを除き、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
アセトアミノフェン	540mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
エテンザミド	400mg	
無水カフェイン	90mg	解熱・鎮痛成分の働きを助けます。
クエン酸チペピジン	48mg	咳を鎮めます。
dl-メチルエフエドリン塩酸塩	40mg	気管支をひろげ、呼吸しやすくします。
ヘスペリジン	30mg	(ビタミン類)
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりを抑えます。

添加物として部分アルファー化デンプン、トウモロコシデンプン、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含みます。

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和


【用法・用量】

食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2カプセル	3回
小児（7歳以上15歳未満）	1カプセル	
7歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。
(誤ってPTPシートのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(お問い合わせ先)

伸和製薬株式会社 情報管理室
電 話：03-3639-9771（代表）
受付時間：9時～17時（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



発 売 元 **伸和製薬株式会社**
東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地1

製造販売元 **佐藤薬品工業株式会社**
奈良県橿原市観音寺町9番地の2