

ゴオウ・キキョウ配合
液状かぜ薬

ラモンドール®・ハイ



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児(7歳以上15歳未満)。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

※裏面も必ずお読みください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量
15歳以上	2カプセル
7歳以上15歳未満	1カプセル
7歳未満	服用しないこと

【注意】(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります）



成分・分量 1日量（6カプセル）中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	360mg	熱を下げ、頭痛や筋肉・関節・のどの痛みをやわらげます。
エテンザミド	480mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水・鼻づまり・くしゃみをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	気管支を拡げ、せきをしずめ、たんを出しやすくします。
キキョウ乾燥エキース-S	54mg	
無水カフェイン	40mg	頭痛をやわらげるとともに、他の薬の効果を高めます。
ゴオウ	3 mg	解熱・鎮静作用の他、のどの痛みをやわらげます。

添加物として、ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、エチルパラベン、プロピルパラベン、酸化チタン、黄色5号、青色1号を含有。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤は軟カプセルのため、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変化します）
- (4) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。



お客様相談窓口 電話 076-493-5010
月～金（祝祭日を除く） 9時～17時

製造販売元



中央薬品株式会社
富山県富山市西四十物町4-9