

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

か ぜ 薬

リコデ[®] 顆 粒 — S

⚠ 《使用上の注意》



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
便秘、口のかわき

効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法及び用量

下記の量を1日3回 食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年 齢	1 回 量
15歳以上	1包
11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包
3歳以上 7歳未満	1/3包
1歳以上 3歳未満	1/4包
1歳未満の乳幼児	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分及び分量

1包（1.3g）中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
アセトアミノフェン	300mg
マレイン酸クロルフェニラミン	2.5mg
カフェイン	30mg
リン酸ジヒドロコデイン	8mg
d,l-塩酸メチルエフェドリン	18mg
桂枝湯乾燥エキス	100mg

添加物として乳糖、ブレイショデンプン、CMC-Na、サッカリンNaを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地