

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

かぜ薬 レボチリンH.D

レボチリンH.Dは、昔から漢方のかぜ薬として有名な桂枝湯に、すぐれた解熱鎮痛効果のあるエテンザミド、アセトアミノフェン、鼻水・鼻づまり・のどの痛みなどのアレルギー症状に強い抑制作用のあるマレイン酸クロルフェニラミンを配合したかぜ薬で、かぜの症状にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- | | |
|--|--|
| (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 | (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難 |
| (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。 | (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 |
| (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 | |

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

間 質 性 肺 炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
11才以上15才未満	$\frac{2}{3}$ 包
7才以上11才未満	$\frac{1}{2}$ 包
3才以上7才未満	$\frac{1}{3}$ 包
3才未満の乳幼児	服用しないこと

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

3包(1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	成 分	含 量
桂枝湯乾燥エキス	720mg	マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg
ケイヒ 4 シャクヤク 4 タイソウ 4 ショウキョウ 1 カンゾウ 2 左記割合の混合生薬 7.2gより乾燥エキ ス720mgを得る。		エテンザミド	600mg
		アセトアミノフェン	540mg
		無水カフェイン	150mg

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、白糖、無水ケイ酸を含有する。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (4) 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

■ お問い合わせ先 増田製薬株式会社 お客様相談係 電話 0744-27-4381

たい印

【受付時間 9時から17時まで 土、日、祝日を除く】



製造販売元

増田製薬株式会社

奈良県橿原市川西町429