

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

かぜ薬 レボチリン 糖衣

本剤は解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、中枢性鎮咳薬および無水カフェインをバランスよく配合した非ピリン系かぜ薬で、かぜの諸症状にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘 (水ぼうそう) 若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児 (15才未満)。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦 しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激 しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等が あらわれる。

裏面に続く

間 質 性 肺 炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量
大人（15才以上）	4 錠
7才以上15才未満	2 錠
5才以上7才未満	1 錠
5才未満の乳幼児	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

12錠（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	成 分	含 量
アセトアミノフェン	540mg	マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg
エテンザミド	600mg	無水カフェイン	150mg
ヒベンズ酸チペジジン	60mg		

添加物として青色1号、ゼラチン、炭酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、ケイ酸Al、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、タルク、酢酸ビニル樹脂、カオリン、酸化チタン、アラビアゴム、パラフィン、カルナウバロウ、白糖を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

■ お問い合わせ先 増田製薬株式会社 お客様相談係 電話 0744-27-4381
[受付時間 9時から17時まで 土、日、祝日を除く]

たい印



製造販売元

増田製薬株式会社

奈良県橿原市川西町429