

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬配合・粉末のかぜ薬

第②類医薬品

改 源 カイゲン

特 徴

- 『改源』は非ピリン系のかぜ薬です。
- 抗ヒスタミン剤が入っていませんから、ねむけを起こすことの少ないかぜ薬です。
- かぜの回復を助ける生薬成分のカンゾウ末、ケイヒ末、ショウキョウ末を配合していますので、独特の風味があります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
 3. 服用時は飲酒しないでください
 4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。
高熱
(8)次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、高血圧、甲状腺機能障害、糖尿病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発 疹 ・ 発 赤 、 か ゆ み
消 化 器	悪 心 ・ 嘔 吐 、 食 欲 不 振
精 神 神 経 系	め ま い

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜ ん そ く	

- (2)5～6回服用しても症状がよくならない場合。

効 能

かぜの諸症状（のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量


次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に茶湯又は湯水で服用してください。

年 齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	7才以上 ～11才未満	3才以上 ～7才未満	1才以上 ～3才未満
1回量	1包	2／3包	1／2包	1／3包	1／4包

<用法・用量に関連する注意>


- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
 - (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
 - (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
 - (4)1才未満には服用させないでください。
- *服用の際は、粉薬をこぼさないようにご注意ください。

①



包み紙を広げます。

②



四角又は三角になるように折り目をつけ、粉薬を中央に寄せます。

③



茶湯又は湯水を口に含み、服用してください。

成分と作用

3包(2,100mg)中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	作 用
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	せきをしずめ、のどを楽にします。
無 水 カ フ ェ イ ン	75mg	頭痛をやわらげます。
カ ン ゾ ウ 末	200mg	せきをしずめ、たんを出しやすくし、かぜの回復を助けます。
ケ イ ヒ 末	200mg	頭痛をやわらげ、熱を下げ、かぜの回復を助けます。
シ ョ ウ キ ョ ウ 末	100mg	せきをしずめ、かぜの回復を助けます。
ア マ チ ャ 末	120mg	添加物として左記を含有します。 また、改源は味と香りの点に留意しており、茶湯でのむとき特にのみやすくなるよう、これらの賦形薬を配合しております。
ℓ-メントール	5.0mg	
d-ボルネオール	9.0mg	
チ ョ ウ ジ 油	0.6mg	
バ ニ リ ン	0.52mg	
香 料	微量	
無水リン酸水素カルシウム	459.88mg	

<かぜを早く治すために>

- 暖かくしてよく眠り、身体を十分に休めましょう。
- 消化が良く栄養のある食事と水分の補給に心がけましょう。
- 入浴を控えて、酒・タバコは止めましょう。
- 部屋が乾燥しないよう気をくばりましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)1包を分割し服用した残りは、包み紙をもとどおりに折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)大包装(60包)に添付している袋は携帯用としてお使いください。
- (6)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。
株式会社カイゲン「お客様相談室」 電話 06-6202-8911
受 付 時 間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）