

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

解熱生薬「ゴオウ」「地竜」配合

胃にやさしいかぜ薬

救風ゴールドDX(かぜ薬)

「胃を守る」成分である酸化マグネシウムを配合したかぜ薬で、小児(7才以上)からお年寄りまで使用できます。

「熱」「はな」「のど」「せき」「頭痛」など、かぜの諸症状に効果をあらわす非ピリン系の総合かぜ薬です。

ゴオウ、地竜という2種類の生薬が「熱」に対する効果を助けます。



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

4. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)

5. 服用時は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

(1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人または家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫(むくみ)、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱とともに、発疹・発赤、やけどのような水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)とともに、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 ※これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいため、空せきや発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止し、医師の診療を受けてください。
ぜんそく	

(2) 5～6 回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

用法および用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	 2カプセル	3回   
7才以上15才未満	 1カプセル	
7才未満	✕ 服用しないでください	

〈用法および用量に関連する注意〉

- (1) 用法および用量を必ず守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方
下図のようにカプセルの入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)
- (4) 水またはぬるま湯で服用してください。
- (5) カプセルは開けずにそのまま服用してください。



効能または効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



成分および分量 1日量(6 カプセル)中

ゴオウ 20mg	ウシの胆のうもしくは胆管中に生じたものの。主成分はビリルビン系色素、胆汁酸で解熱作用がある動物性の生薬です。
地竜(シリウ)乾燥工キス 129mg(原生薬換算量 993.3mg)	解熱作用のある動物性の生薬です。
アセトアミノフェン 600mg	熱や痛みの中核に作用し、解熱・鎮痛効果をあらわします。非ビリン系。
無水カフェイン 75mg	痛みをやわらげ、熱を下げる働きを助けます。
マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg	鼻・のど等にかかる炎症をおさえ、鼻水、鼻づまり、くしゃみ等をおさえます。
リン酸ジヒドロコデイン 24mg	せきの中核に働いて、せきをしずめます。
d-塩酸メチルエフェドリン 60mg	気管支をひろげ、せきをしずめて呼吸を楽にします。
酸化マグネシウム 140mg	胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。

添加物として、パレイショデンプン、炭酸 Ca、ステアリン酸 Ca、ゼラチン、酸化チタン、三酸化鉄、マクロゴール、ラウリル硫酸 Na、ステアリン酸 Mg を含有します。

〈保管および取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 冷蔵庫で保管しないでください。
(室温との差により、結露が生じ、品質が変わるおそれがあります。)
- (3) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (5) カプセルの入っているシートを切り取る場合は、シートの角でけがをしないよう注意してください。
- (6) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
☎ 0120-149-931

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎ 0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP
常盤薬品はノビアグループです。



この添付文書は、カラーユニバーサルデザイン機構(CUD)により、色覚の個人差に配慮したものと認証されています。