

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

生薬製剤

銀翹散エキス顆粒A クラシエ

(ギンギョウサン)

特 徴

- 「銀翹散エキス顆粒A クラシエ」は、漢方の古典といわれる中国の医書「カンビョウショウベン温病条弁」に収載されている「銀翹散」という薬方を基本に創られた処方です。
- かぜによるのどの痛みや頭痛・せきなどの症状に効果があります。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

短期間の服用にとどめ、連用はしないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 高齢者
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

効 能

かぜによるのどの痛み・口（のど）の渇き・せき・頭痛



口の渇き



のどの痛み

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	1／2包	
7才未満5才以上	1／4包	
5才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量3包（1包2.3g）中、次の成分を含んでいます。

銀翹散エキス粉末5,900mg

キンギンカ・レンギョウ各4.26g、ハッカ・キキョウ・カンゾウ各2.556g、タンチクヨウ・ケイガイ各1.704g、タンズシ・ゴボウシ各2.136g、レイヨウカク0.132gより抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ケイ酸Alを含有する。

＜成分に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

●換気に気を
つけましょう



空気が汚れていると、せきを誘発することにもつながります。冬は寒いからと閉めきらずに、ときどき窓を開けて新鮮な空気と入れ替えましょう。

●外出後は
うがいと手洗いを



人がたくさん集まる場所は、かぜのウイルスも多く、感染しやすいです。帰宅したら、うがいと手洗いを習慣づけましょう。

●部屋を
乾燥させない



乾燥した部屋は、のどのためによくありません。加湿器を使って湿度を適度に保つようにしましょう。濡れタオルをつるだけでも加湿効果があります。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）