

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

かぜ薬

第2類医薬品

小児用 ツーランシロップ[®]

小児用ツーランシロップは、解熱鎮痛成分、非麻薬性の鎮咳去たん成分、鼻かぜ・鼻炎の諸症状に用いられる漢方薬を配合した小児用の総合かぜ薬です。
熱・頭痛・せき・のどの痛み・鼻づまりなど、かぜの諸症状によく効きます。

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがある)
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (5)次の症状のある人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人 高熱、排尿困難
(3)高齢者 (6)次の診断を受けた人
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	呼吸器	息切れ、息苦しさ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感	泌尿器	排尿困難
精神神経系	めまい	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
ぜんそく	息をすときぜーぜー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和


用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内及び必要な場合には就寝前に服用してください
場合によっては、1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合には原則として、約4時間の間隔をおいて服用してください

年 齢	1 回量
3才以上7才未満	8 mL
1才以上3才未満	6 mL
6ヵ月以上1才未満	4.5 mL
3ヵ月以上6ヵ月未満	4 mL
3ヵ月未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- 添付の目盛り付きコップに1回量を計り、正しく服用させてください
コップの数字はmLを表します
- 2才未満の乳幼児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください



成分・分量

48mL中に次の成分を含んでいます

成 分	含 量	はたらき
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、痛みをやわらげます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.4mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状をおさえます
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	15mg	せきをしずめ、気管支拡張作用によりたんを出しやすくします
グアイフェネシン	80mg	
無水カフェイン	48mg	頭痛をしずめます
小青竜湯流エキス	4 mL マオウ 0.50g カンゾウ 0.33g シャクヤク 0.50g ショウキョウ 0.33g ケイヒ 0.50g サイシン 0.50g ゴミシ 0.50g ハンゲ 0.83g より得たエキス	くしゃみ、鼻水、鼻づまりを主症状とする「鼻かぜ」、「鼻炎」の諸症状をやわらげます

添加物として、D-ソルビトール、パラベン、プロピレングリコール、香料、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、バニリン、白糖、水アメ、カラメルを含有しています

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください
- キャップが開けにくいときは、キャップの部分を50～60℃のお湯に2～3分つけると開けやすくなります

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**
京都府向日市上植野町南開35-3