

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

かぜ薬

生薬配合シロップ

頭痛・発熱・鼻水・鼻づまりに

いっ ふう いん

小児用 一風飲「コタロ-」

本剤は、熱を下げ、せきを鎮める地竜や南天実、発汗解熱作用のある桂皮、
生姜、のどの痛みを鎮める甘草などの和漢薬に解熱鎮痛薬のアセトアミノフ
ェン、鼻水やくしゃみに効くマレイン酸クロルフェニラミン、せきやたんをと
るdl-塩酸メチルエフエドリン、グアイフェネシン、頭痛等に有効なカフェイ
ンなどを配合したお子様用のかぜシロップです。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載してい
ます。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがあ
る人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有す
る内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指
腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相
談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診
療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ 等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷 たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(裏面につづく)

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (ステイアブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、頭痛、発熱、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

1日3回食後、及び必要な場合には、就寝前に服用してください。
また場合により、1日6回まで約4時間の間隔をおいて服用してください。
(添付のコップは10mLです)

年 齢	1 回 量
3 歳以上 7 歳未満	5mL
1 歳以上 3 歳未満	3.5mL
6 ヶ月以上 1 歳未満	3 mL
6 ヶ月未満服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】 1 瓶 (30mL) 中に

地竜エキス ……………21mg (ジリュウ161.7mgに相当)	甘草エキス……………130mg (カンゾウ390mgに相当)
生姜流エキス……………0.4mL (ショウキョウ400mgに相当)	南天実流エキス……………0.8mL (ナンテンジツ800mgに相当)
桂皮流エキス……………0.5mL (ケイヒ500mgに相当)	アセトアミノフェン……………250mg
マレイン酸クロルフェニラミン…2.5mg	dl-塩酸メチルエフェドリン ……12mg
無水カフェイン ……………45mg	グアイフェネシン ……………80mg

添加物としてポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、パラベン、香料、エタノール、ベンジルアルコール、バニリンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振って服用してください。

【包装】 30mL

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)



発 売 元 **小太郎漢方製薬株式会社**

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

製造販売元 **大 昭 製 薬 株 式 会 社**

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168