

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

商品番号

Z32


第②類医薬品 **かぜ薬** 生薬配合シロップ
頭痛・発熱・鼻水・鼻づまりに

小児用 一風飲「コタロ」

本剤は、熱を下げ、せきを鎮める地竜や南天実、発汗解熱作用のある桂皮、生姜、のどの痛みを鎮める甘草などの和漢薬に解熱鎮痛薬のアセトアミノフェン、鼻水やくしゃみに効くクロルフェニラミンマレイン酸塩、せきやたんをとるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、頭痛等に有効なカフェインなどを配合したお子様用のかぜシロップです。

 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)高齢者。
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、頭痛、発熱、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

1日3回食後、及び必要な場合には、就寝前に服用してください。また場合により、1日6回まで約4時間の間隔をおいて服用してください。（添付のコップは10mLです）

年 齢	1回量
3歳以上7歳未満	5mL
1歳以上3歳未満	3.5mL
6ヵ月以上1歳未満	3mL
6ヵ月未満服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1瓶（30mL）中に

地竜エキス ……………21mg （ジリュウ161.7mgに相当）	甘草エキス……………130mg （カンゾウ390mgに相当）
生姜流エキス ……………0.4mL （ショウキョウ400mgに相当）	南天実流エキス……………0.8mL （ナンテンジツ800mgに相当）
桂皮流エキス……………0.5mL （ケイヒ500mgに相当）	アセトアミノフェン……………250mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩…2.5mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ……12mg
無水カフェイン ……………45mg	グアイフェネシン ……………80mg

添加物としてポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、パラベン、香料、エタノール、ベンジルアルコール、バニリンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振って服用してください。

【包装】 30mL

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。
 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
 受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **小太郎漢方製薬株式会社**

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

製造販売元 **大昭製薬株式会社**

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168