

## 小児用新マイフロンシロップ

2023年1月 使用上の注意改訂に伴う変更：\_\_\_\_\_部

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	かぜ薬（内用）
製品名	小児用新マイフロンシロップ
製品の特徴	<p>「かぜ」にかかると、鼻水が出る、くしゃみが出るなどの症状から、のどが痛い、熱が出る、頭が痛い、さむけがするなどの症状へと進んでいきますので、「かぜ」はひきはじめに治すことが大切です。</p> <p>小児用新マイフロンシロップは解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬などを配合した飲みやすいシロップ剤で、かぜの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。</p>
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b> （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>次の人は服用しないでください</b> (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li><li>2. <b>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください</b> 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）</li><li>3. <b>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</b> （眠気等があらわれることがあります。）</li><li>4. <b>授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</b></li><li>5. <b>服用前後は飲酒しないでください</b></li><li>6. <b><u>長期連用しないでください</u></b></li></ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</b> (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li></ol>

(5) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
<u>薬剤性過敏症症候群</u>	<u>皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。</u>
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">呼吸抑制</td> <td>息切れ、息苦しさ等があらわれる。</td> </tr> </table> <p>3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気</p> <p>4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>	呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。																			
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。																					
<b>効能・効果</b>	かぜの諸症状（発熱、せき、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																					
<b>用法・用量</b>	<p>次の用法・用量を守り、いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。必要な場合には就寝前にも服用してください。また1日6回まで服用しても差し支えありませんが、1日6回服用する場合には、原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。1回量を量り得る容器を添付してあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年 齢</th> <th style="width: 15%;">1回量</th> <th style="width: 15%;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3歳以上7歳未満</td> <td>2.5mL</td> <td rowspan="4">3～6回</td> </tr> <tr> <td>1歳以上3歳未満</td> <td>1.8mL</td> </tr> <tr> <td>6ヵ月以上1歳未満</td> <td>1.5mL</td> </tr> <tr> <td>3ヵ月以上6ヵ月未満</td> <td>1.2mL</td> </tr> <tr> <td>3ヵ月未満の乳児</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	1回量	1日服用回数	3歳以上7歳未満	2.5mL	3～6回	1歳以上3歳未満	1.8mL	6ヵ月以上1歳未満	1.5mL	3ヵ月以上6ヵ月未満	1.2mL	3ヵ月未満の乳児	服用しないこと							
年 齢	1回量	1日服用回数																				
3歳以上7歳未満	2.5mL	3～6回																				
1歳以上3歳未満	1.8mL																					
6ヵ月以上1歳未満	1.5mL																					
3ヵ月以上6ヵ月未満	1.2mL																					
3ヵ月未満の乳児	服用しないこと																					
<b>用法関連注意</b>	<p>(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p> <p>(2) 7歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。</p>																					
<b>成分分量</b>	<p>15mL 中</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">成 分</th> <th style="width: 15%;">分量</th> <th style="width: 15%;">内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>8mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>180mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>2.5mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dI-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>12mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジリュウ流エキス</td> <td>0.4mL</td> <td>(地竜 400mg)</td> </tr> <tr> <td>セネガ流エキス</td> <td>0.2mL</td> <td>(セネガ 200mg)</td> </tr> </tbody> </table>	成 分	分量	内訳	ジヒドロコデインリン酸塩	8mg		アセトアミノフェン	180mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg		dI-メチルエフェドリン塩酸塩	12mg		ジリュウ流エキス	0.4mL	(地竜 400mg)	セネガ流エキス	0.2mL	(セネガ 200mg)
成 分	分量	内訳																				
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg																					
アセトアミノフェン	180mg																					
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg																					
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	12mg																					
ジリュウ流エキス	0.4mL	(地竜 400mg)																				
セネガ流エキス	0.2mL	(セネガ 200mg)																				
<b>添加物</b>	白糖、D-ソルビトール、アルコール、サッカリンナトリウム、クエン酸ナトリウム、カラメル、塩化ナトリウム、安息香酸ナトリウム、クエン酸、l-メントール、香料																					

<b>保管及び取扱い上の注意</b>	<p>(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。</p> <p>(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p> <p>(5) 開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。</p>
<b>消費者相談窓口</b>	<p>会社名：日本製薬工業株式会社  問い合わせ先：お客様相談室  電話：（0568）42-1234  受付時間：9：00～12：00 14：00～17：00（土、日、祝日を除く）</p>
<b>製造販売会社</b>	<p>日本製薬工業株式会社</p>
<b>販売会社</b>	<p>日本製薬商事株式会社</p>
<b>剤形</b>	<p>液剤</p>
<b>リスク区分等</b>	<p>第②類医薬品</p>