

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 新ジキニン<sup>®</sup>顆粒

## — 総合感冒薬 —

新ジキニン顆粒は、鎮咳剤リン酸ジヒドロコデインや解熱鎮痛剤アセトアミノフェン、鎮咳・去痰作用のある生薬カンゾウ(甘草)エキスなどの働きで、かぜに伴うせき、発熱、頭痛などの症状によく効く、3才のお子さまから大人まで服用できるかぜ薬です。

### 【使用上の注意】



#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがある。)

#### 4. 服用時は飲酒しないでください。

#### 5. 長期連用しないでください。

#### 相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

#### (8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこぼれる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。  
便秘、口のかわき

### 【効能・効果】

かぜの諸症状(せき、発熱、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

### 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	1 包	3回
11才以上 15才未満	2/3包	
7才以上 11才未満	1/2包	
3才以上 7才未満	1/3包	
3才未満	服用しないこと	

#### 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
(2) 本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

### 【成 分】(1包1.5g中)

リン酸ジヒドロコデイン	8 mg
dl-塩酸メチルエフェドリン	20 mg
アセトアミノフェン	300 mg
マレイン酸クロルフェニラミン	2.5 mg
無水カフェイン	25 mg
カンゾウ(甘草)エキス	150 mg (原生薬換算量 750 mg)

添加物としてタルク、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。  
(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)  
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
(5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

### 問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店  
2) お客様相談室

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-22-14

電話：03(3986)0613

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝祭日を除く)



製造販売元

**全薬工業株式会社**

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

http://www.zenyaku.co.jp