

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第②類医薬品

感冒薬 新 パブトン ゴールド[®]

新パブトンゴールドは、風邪の初期症状に対して優れた効果を発揮するように、洋薬の良さと漢薬の良さとを取り入れた飲みやすい分包顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないで下さい
- 長期連用しないで下さい

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
(8) 次の診断を受けた人。 肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(裏面に続きます)

間質性肺炎

空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)

ぜんそく

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき

適応症 かぜの諸症状(悪寒、発熱、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法・用量 次の量を食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包	3 回
7 歳以上11歳未満	1/2包	3 回
3 歳以上 7 歳未満	1/3包	3 回
1 歳以上 3 歳未満	1/4包	3 回
1 歳未満	服用しないで下さい	

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

(3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用して下さい。

成分と作用 1日量3包中に次の成分を含んでいます。

成 分	3 包中	主な作用
キキョウエキス (キキョウ400mgに相当)	100mg	せきやのどの痛みを和らげます。
カンゾウエキス粉末 (カンゾウ600mgに相当)	76.8mg	せきやのどの痛みを和らげます。
地竜エキス散(地竜300mgに相当)	150mg	熱をさげ、気管支を拡張します。
アセトアミノフェン	810mg	熱をさげ、頭痛やのどの痛みを鎮めます。
無水カフェイン	75mg	頭痛を鎮めます。
クエン酸チペビジン	60mg	せきをしずめ、たんをきりのどの痛みを和らげます。
dI-塩酸メチルエフェドリン	60mg	せきをしずめ、たんをきりのどの痛みを和らげます。
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
硝酸チアミン	18mg	かぜに伴う高熱で弱った体力の回復を早めます。
リボフラビン	9mg	かぜに伴う高熱で弱った体力の回復を早めます。

添加物：デヒドロ酢酸Na、パレイショデンブン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、メタリン酸Na、香料、バニリン、l-メントール
<成分に関連する注意>

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (4) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先 田村薬品工業株式会社 お客様相談室
0745-66-2636 受付時間10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**
奈良県御所市西寺田50