

感冒薬

新 パプトン ゴールド[®]

新パプトンゴールドは、風邪の初期症状に対して優れた効果を発揮するように、洋薬の良さと漢薬の良さを取り入れた飲みやすい分包顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してせんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳祛痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期運用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人は。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿瘍)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
せんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

(裏面に続きます)

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、尿尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること □のかわき、眠気	□のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること	

*効能・効果 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 次の量を食後なるべく30分以内に服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	3回
7歳以上11歳未満	1/2包	3回
3歳以上 7歳未満	1/3包	3回
1歳以上 3歳未満	1/4包	3回

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

(3) 用法・用量を厳守すること。

成分・分量・作用 1日量3包中に次の成分を含む。

成 分	3 包 中	主な作用
キキョウエキス (キキョウ400mgに相当)	100mg	せきやのどの痛みをやわらげる。
カンゾウエキス粉末 (カンゾウ600mgに相当)	76.8mg	せきやのどの痛みをやわらげる。
地竜エキス散 (ジリュウ300mgに相当)	150mg	熱をさげ、気管支を拡張する。
アセトアミノフェン	810mg	熱をさげ、頭痛やのどの痛みをしづめる。
無水カフェイン	75mg	頭痛をしづめる。
クエン酸チペピシン	60mg	せきをしづめ、たんをきる。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	のどの痛みをやわらげ、せきをしづめる。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえる。
チアミン硝化物	18mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンB ₁ の補給。
リボフラビン	9mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンB ₂ の補給。

添加物：デヒドロ酢酸Na、パレイショデンプン、無水ケイ酸、

ヒドロキシプロピルセルロース、メタリン酸Na、香料、バニリン、I-メントール

<成分に関連する注意>

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先 田村薬品工業株式会社 お客様相談室
06-6203-5151 受付時間10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50