

服用前にこの説明書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

第②類医薬品

感冒薬

新 パプトン[®] ゴールド

新パプトンゴールドは、風邪の初期症状に対して優れた効果を発揮するように、洋薬の良さと漢薬の良さとを取り入れた飲みやすい分包顆粒剤です。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
* 薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 次の量を食後なるべく30分以内に服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	3回
7歳以上11歳未満	1/2包	3回
3歳以上7歳未満	1/3包	3回
1歳以上3歳未満	1/4包	3回

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
(2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
(3) 用法・用量を厳守すること。
- 成分・分量、作用 1日量3包中に次の成分を含む。

成 分	3包中	主な作用
キキョウエキス (キキョウ400mgに相当)	100mg	せきやのどの痛みをやわらげる。
カンゾウエキス粉末 (カンゾウ600mgに相当)	76.8mg	せきやのどの痛みをやわらげる。
地竜エキス散 (ジリュウ300mgに相当)	150mg	熱をさげ、気管支を拡張する。
アセトアミノフェン	810mg	熱をさげ、頭痛やのどの痛みをしずめる。
無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめる。
クエン酸チペジジン	60mg	せきをしずめ、たんをきる。
d1-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	のどの痛みをやわらげ、せきをしずめる。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえる。
チアミン硝化物	18mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンB ₁ の補給。
リボフラビン	9mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンB ₂ の補給。

添加物：デヒドロ酢酸Na、バレイショデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、メタリン酸Na、香料、バニリン、l-メントール

〈成分に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

田村薬品工業株式会社 お客様相談室
電 話 06-6203-5151
受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50