

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

第②類医薬品

かぜによる のどの痛み・頭痛・発熱・せき

## かぜ薬 総合ハヤオキS

「総合ハヤオキS」は、熱を下げ痛みによく効くアセトアミノフェン、エテンザミド、無水カフェイン、せきをしずめるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、ノスカピン、くしゃみ、鼻水、鼻づまりによく効く抗アレルギー薬、クロルフェニラミンマレイン酸塩、毛細血管を強化し細菌の侵入をふせぐヘスベリジン配合した、総合かぜ薬です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

##### 2. 本剤を服用する間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

##### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)

##### 4. 服用前後は飲酒しないこと

##### 5. 長期連用しないこと



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (5) 高齢者。
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvensン・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る。息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

裏面に続く

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 成分及び分量と働き 1日量(9錠)中

成 分	分 量	働 き
アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、頭痛や、のど、関節の痛みをやわらげるのによく効きます。
エテンザミド	500mg	
無水カフェイン	100mg	頭痛をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなど、アレルギー症状をおさえます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg	すみやかにせきをおさえます。
ノスカピン	45mg	
ヘスベリジン	27mg	抗酸化作用があり毛細血管の脆弱性を防止します。

添加物として、結晶セルロース、バレイショデンプン、カルメロースカルシウム、アラビアゴム末、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、白糖、カオリン、ゼラチン、カルナウバロウを含有します。

### 効能又は効果

かぜの諸症状(のどの痛み、頭痛、発熱、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

### 用法又は用量

次の量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

#### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)



### お問い合わせ先

薬王製薬株式会社 「お客様相談室」

電話：0744-33-8855

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 薬王製薬株式会社 奈良県磯城郡田原本町245番地