

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



医薬部外品

ヴァイックス ヴェポラップ

〈鼻づまり改善薬〉

ヴァイックス ヴェポラップは、胸・のど・背中にぬることで、鼻づまり、くしゃみなど、かぜに伴う諸症状を緩和します。



△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、傷口)等。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。
- (6) 熱がある人又は症状が長引いている人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

(2) 7日間使用しても症状がよくならない場合。

用法・用量

次の量を胸・のど・背中に塗布、又は塗布後布で覆ってください。(3gは、ティースプーン1杯が目安です)

| 年齢 | 12才以上 | 6~11才 | 3~5才 | 6か月~2才 | 6か月未満 |
|------|-------|-------|------|--------|---------|
| 1回量 | 6~10g | 5g | 4g | 3g | 使用しないこと |
| 使用回数 | 1日3回 | | | | × |

【注意】

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

効能

鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和

成分

100g中

dl-カンフル 5.26g、テレピン油 4.68g、l-メントール 2.82g、ユーカリ油 1.33g、ニクスク油 0.69g、杉葉油 0.44g

添加物：チモール、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
http://www.taisho.co.jp