

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
承認販売名	
製品名	はれやかS
製品名（読み）	ハレヤカS
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないこと <ol style="list-style-type: none"> （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）本剤又は他の解熱鎮痛薬，かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬，かぜ薬，鎮静薬，乗物酔い薬 3. 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと （眠気等があらわれることがある。） 4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師，歯科医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。 （4）高齢者。 （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （6）次の診断を受けた人。 心臓病，腎臓病，肝臓病，胃・十二指腸潰瘍 2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること <p>[関係部位：症状] 皮膚：発疹・発赤，かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐，食欲不振 精神神経系：めまい その他：過度の体温低下</p>

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

〔症状の名称：症状〕

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果	1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 2) 悪寒・発熱時の解熱				
効能関連注意					
用法・用量	1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。ただし、服用間隔は6時間以上おいてください。 15歳以上：1回：1包 11歳以上15歳未満：1回：2/3包 7歳以上11歳未満：1回：1/2包 3歳以上7歳未満：1回：1/3包 1歳以上3歳未満：1回：1/4包 1歳未満：服用しないこと				
用法関連注意	(1) 用法及び用量を厳守してください。 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。				
成分分量	2包中 <table border="1" data-bbox="544 2033 1246 2130"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>600.0mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	600.0mg
成分	分量				
アセトアミノフェン	600.0mg				

	<table border="1"> <tr> <td>エテンザミド</td> <td>1000.0mg</td> </tr> <tr> <td>アリルイソプロピルアセチル尿素</td> <td>100.0mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>80.0mg</td> </tr> </table>	エテンザミド	1000.0mg	アリルイソプロピルアセチル尿素	100.0mg	無水カフェイン	80.0mg
エテンザミド	1000.0mg						
アリルイソプロピルアセチル尿素	100.0mg						
無水カフェイン	80.0mg						
添加物	カルメロースカルシウム, カンゾウ末, 白糖, 果糖, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム, アマチャ末, d-ボルネオール, l-メントール						
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。</p> <p>(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。</p> <p>(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>						
消費者相談窓口	<p>会社名：大協薬品工業株式会社</p> <p>問い合わせ先：お客様相談窓口</p> <p>電話：076-479-1313</p> <p>受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）</p>						
製造販売会社	<p>大協薬品工業（株）</p> <p>会社名：大協薬品工業株式会社</p> <p>住所：富山市水橋畠等173</p>						
販売会社	富山めぐみ製薬株式会社 <u>添付文書情報</u>						
剤形	散剤						
リスク区分等	第「2」類医薬品						