

頭痛・歯の痛みに

ピリン系解熱鎮痛薬
セデス・ハイ



セデス・ハイは、鎮痛作用の強いイソプロピルアントピリンをはじめ4種類の成分を配合することにより、強い痛みにもすぐれた鎮痛効果をあらわします。小型の服用しやすい錠剤で速く効きしかも効果が持続します。



使用上の注意 ……



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないで下さい

5. 長期連用しないで下さい(この薬は痛み・発熱を一時的に抑えるものです)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人または家族がアレルギー体质の人
- (5) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (6) 次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	恶心・嘔吐、食欲不振		

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、じんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱をともなって、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）などがあらわれる。
ぜんそく	

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

…… 効能・効果 ……

- 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

…… 用法・用量 ……

次の量をなるべく空腹時をさけて、水またはぬるま湯でおのみ下さい。
また、おのみになる間隔は4時間以上おいて下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回を限度とする
15才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。

- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみ下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります)



…… 成分・分量 ……

セデス・ハイは、白色の二層の錠剤で、1錠中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量	は た ら き
イソプロピルアンチピリン(IPA)	75 mg	熱を下げ、痛みをやわらげる
アセトアミノフェン	125 mg	
アリルレイソプロピルアセチル尿素	30 mg	痛みをおさえる働きを助ける
無水カフェイン	25 mg	痛みをおさえる働きを助けるほか、頭痛をやわらげる

添加物としてカルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロビルセルロースを含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1)直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)PTPシートから出して他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

…… 包 装 ……

セデス・ハイ：10錠、20錠

®：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号