

12錠

NEW NIKURON

頭痛・痛み・神経痛

非ステロイド系

NEW ニューニクロン錠F

NEW NIKURON Tab. F

第②類医薬品

頭痛・痛み・神経痛

頭痛・痛み・神経痛

NEW NIKURON

品目番号 29 3巻 082-260

ニューニクロン錠F

第②類医薬品

効能又は効果

- (1) 頭痛・歯痛・筋肉痛の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

15歳以上……………1回2錠
7歳以上15歳未満……………1回1錠
1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。



成型シート

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

配置期限

製造番号

成分及び分量 1日量(6錠)中

1日量 アセトアミノフェン……………	900mg
1日量 エテンザミド……………	800mg
1日量 無水カフェイン……………	240mg
1日量 プロモバルビレル尿素……………	600mg
添加物としてセルロース、無水クイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース及びマクロゴールを含有する。	

1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

注 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないこと

3. 服用が通さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと

5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

12錠入 ￥700.+消費税

製造販売元

寧薬化学工業株式会社

奈良県大和高田市旭南町2-25

あける

肩こり痛・腰痛・神経痛

頭痛・痛み・神経痛

この説明文書はお薬とともに保管してください。
また、服用時によくお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人。(4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(5)高齢者。(6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7)次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすけ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvens-ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る。全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のみくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼーヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)

製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**

奈良県大和高田市旭南町2-25

【問い合わせ】電話番号：0745-22-4151

受付時間：9:00～16:00 (土・日・祝日を除く)