

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



解熱鎮痛薬

頭痛 生理痛 熱 **ノーシンホワイト** 〈細粒〉

パソコンの画面、携帯電話の着信音、複雑な人間関係…。人を緊張させるものに囲まれた暮らし。気がつかないうちに神経が影響を受けています。頭が痛いと感じたら、ノーシンホワイト〈細粒〉。ACE処方(アセトアミノフェン、エテンザミド、カフェイン)の3つの成分の働きにより、頭痛をはじめ、生理痛、歯痛などの痛みや発熱などに早く効き、すぐれた効果を発揮する鎮痛解熱薬です。

特長

- 素早く溶けて吸収され、速やかに鎮痛効果を発揮します。
- アセトアミノフェン、エテンザミドの鎮痛成分に、その働きを助け、頭痛をやわらげるカフェインを配合したACE処方で、すぐれた鎮痛効果を発揮します。
- 胃を荒らす成分や、眠気を催す成分、また、習慣性のある成分も使用しておりません。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用時は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

成 分 アセトアミノフェン……………300mg エテンザミド……………380mg
1包(900mg)中 カフェイン……………60mg

添加物としてグリセロリン酸カルシウム、合成ケイ酸アルミニウム、部分アルファ化デンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

効 能 1) 頭痛・生理痛・歯痛・神経痛・関節痛・腰痛・肩こり痛・咽喉痛・耳痛・抜歯後の疼痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛の鎮痛
2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 次の用量をなるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	2回を限度とする
15才未満の小児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を厳守してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社「アラクス」医薬情報室 TEL 052(951)2055
名古屋市中区丸の内三丁目2-26 〒460-0002
受付：月～金曜(祝日を除く)9:00～16:30

ARAX 株式会社 アラクス
〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目2-26