

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

解熱鎮痛薬



NORSHIN  
WHITE

頭痛 生理痛 熱

第②類医薬品

ノーシンホワイト〈細粒〉

ノーシンホワイト〈細粒〉は、ACE処方(アセトアミノフェン、エテンザミド、カフェイン水和物)の3つの成分の働きにより、頭痛、生理痛、歯痛などの痛みや熱などに速く効きます。胃を荒らす成分や、眠気を催す成分、また、習慣性のある成分は使用しておりません。



## 使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| その他   | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

(裏面につづく)

|                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、<br>皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に<br>小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、<br>食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害                                                         | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、<br>褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                                                  |
| 腎障害                                                           | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだ<br>るさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。                                                    |
| 間質性肺炎                                                         | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れが<br>する・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これ<br>らが急にあらわれたり、持続したりする。                             |
| ぜんそく                                                          | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息<br>苦しい等があらわれる。                                                                  |

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って  
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**成分** アセトアミノフェン……………300mg エテンザミド……………380mg  
1包(900mg)中 カフェイン水和物……………60mg

添加物としてケイ酸Al、グリセリン酸Ca、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Mg  
を含有する。

**効能** 1) 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・神経痛・関節痛・腰痛・肩こり痛・咽喉痛・  
耳痛・抜歯後の疼痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛の鎮痛  
2) 悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 次の用量をなるべく空腹時をさせて服用してください。服用間隔は6時間以上  
おいてください。

| 年 齢       | 1 回 量   | 1日服用回数   |
|-----------|---------|----------|
| 大人(15才以上) | 1包      | 2回を限度とする |
| 15才未満の小児  | 服用しないこと |          |

**<用法・用量に関連する注意>**

定められた用法・用量を厳守してください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

### お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、  
お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけます  
ようお願い申し上げます。

アラクスお客様相談室 ☎ 0120-225-081  
〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26  
受付：9:00～16:30(土・日・祝日を除く)

**ARAX**  
株式会社 アラクス  
〒460-0002  
名古屋市中区丸の内三丁目2-26