

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



HEADACHE MENSTRUAL PAIN AND FEVER
NORSHIN WHITE
TABLETS



解熱鎮痛薬

頭痛 生理痛 熱 ノーシンホワイト錠

パソコンの画面、携帯電話の着信音、複雑な人間関係…。人を緊張させるものに囲まれた暮らし。気がつかないうちに神経が影響を受けています。頭が痛いと感じたら、ノーシンホワイト錠。ACE処方(アセトアミノフェン、エテンザミド、カフェイン)の3つの成分の働きにより、頭痛をはじめ、生理痛、歯痛などの痛みや発熱などに早く効き、すぐれた効果を発揮する鎮痛解熱薬です。

特長

- 素早く溶けて吸収され、速やかに鎮痛効果を発揮します。
- アセトアミノフェン、エテンザミドの鎮痛成分に、その働きを助け、頭痛をやわらげるカフェインを配合したACE処方ですすぐれた鎮痛効果を発揮します。
- 胃を荒らす成分や、眠気を催す成分、また、習慣性のある成分も使用しておりません。



使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

(裏面につづく)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

成 分 アセトアミノフェン……………300mg エテンザミド……………380mg
2錠中 カフェイン……………60mg

添加物としてグリセロリン酸カルシウム、合成ケイ酸アルミニウム、部分アルファ化デンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

効 能 1) 頭痛・生理痛・歯痛・神経痛・関節痛・腰痛・肩こり痛・咽喉痛・耳痛・抜歯後の疼痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛の鎮痛
2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 次の用量をなるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	2回を限度とする
15才未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右上図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



PTPシート取り出し図

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社「アラクス医薬情報室」 TEL 052(951)2055

名古屋市中区丸の内三丁目2-26 〒460-0002

受付：月～金曜(祝日を除く) 9:00～16:30

製品情報をホームページでご覧ください。 www.arax.co.jp

ARAX 株式会社 アラクス
〒460-0002

名古屋市中区丸の内三丁目2-26