解熱鎮痛薬

胃にやさしいのに速く効く

小粒でのみやすい錠剤

頭痛・熱に

第②類 医薬品



ノーシン錠は、ACE処方の3つの有効成分(アセトアミノフェン、エテンザミド、 カフェイン水和物)が協力的に作用して、頭痛やいろいろな痛み・発熱に 速く効き、すぐれた効果を発揮するようにつくられた鎮痛解熱薬です。

- ●頭痛によく効く、3つの有効成分を配合したACE処方です。
- ■胃にやさしいのに速く効きます。
- ●小粒でのみやすい錠剤です。
- ●眠くなる成分や習慣性のある成分は含まれていません。

使用上の注意

- 1. 次の人は服用しないでください
- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 3. 服用時は飲酒しないでください
- 4. 長期連用しないでください

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。
 - 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状		
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ		
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振		
精神神経系	めまい		

(裏面につづく)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

 症状の名称
ショック (アナフィラキシー)
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)
肝機能障害
全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2)5~6回服用しても症状がよくならない場合

成分と作用 2錠中

成 分	2錠(1回量)中	作用
アセトアミノフェン	300mg	中枢に作用して痛みや熱を速くおさえます。
エテンザミド	160mg	アセトアミノフェンと協力して、痛みや熱をおさえます。
カフェイン水和物	70mg	アセトアミノフェン、エテンザミドの痛みをおさえる働きを助け、頭痛をやわらげます。

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、アルファー化デンプン、ステアリン酸Mgを含有する。

効 能

1) 頭痛・歯痛・月経痛(生理痛)・神経痛・関節痛・腰痛・肩こり痛・咽喉痛・耳痛・ 抜歯後の疼痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛の鎮痛

2) 悪寒・発熱時の解熱

用法·用量

次の用量をなるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	3回を限度とする
15才未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方

右上図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

アラクスお客様相談室 **3**.0120-225-081 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26 受付: 9:00~16:30(土・日・祝日を除く) 製品情報をホームページでご覧ください。 www.arax.co.jp

ARAX

株式会社アラクス

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

おしだす」

PTPシート取り出し図