

△ 使用上の注意 × してはいけないこと 解熱鎮痛薬

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、カゼ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。(4) 出産予定日12週以内の妊婦。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬、カゼ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないこと 4. 長期連用しないこと

■ 困るること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、腎・十二指腸潰瘍 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、青あざができる／消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血／精神神経系：めまい／その他：鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下
- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿瘍症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと喘ぐ、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

2包(1包1g×2)入 ¥200+税

配置期限



TRADE



MARK

第②類
医薬品

金魚 づい・はいた ノーヤクA 解熱鎮痛薬



効能又は効果

1. 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・目痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・むねさ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

2. 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

大人(15歳以上)……………1回1包
15歳未満は服用しないこと。

1日1回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用すること。

成分及び分量 1包(1,000mg)中
日局 アスピリン400mg、日局 アセトアミノフェン300mg、日局 無水カフェイン100mg 添加物としてリン酸水素Ca、バレイショデンプン、ケイヒ末、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元 大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川西町632-1
お問い合わせ先 ☎ 0744-27-3325