

ずつう・はいた

第②類医薬品

# ピタリンA



発売  
仁生薬品株式会社  
富山県滑川市堀江636

第②類医薬品

非ピリン系

品目番号78-491

# ピタリンA

## 効能・効果

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2)悪寒・発熱時の解熱

## 用法・用量

15才以上(大人)……1回1包・11才以上15才未満……1回1/2包  
7才以上11才未満……1回1/4包・3才以上7才未満……1回1/8包  
1才以上3才未満……1回1/8包  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。  
服用間隔は6時間以上おいてください。

## 成分・分量

1日量(2包)中  
アセトアミノフェン ……600mg・エテンザミド ……1,000mg  
アルインプロビルアセチル尿素 100mg・無水カフェイン ……160mg  
添加物としてタルク、クエン酸Ca、黄色5号を含有します。  
その他の添加物成分は、添付文書をご覧ください。 1包量950mg

## 注意

- 次の人は服用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
- 服用が速さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用に際しては、添付文書をよくお読みください。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **中新薬業株式会社**  
富山県滑川市上小泉504-2  
お客様相談室 電話076(475)2121

3包入

使用期限

神  
経  
痛

生  
理  
痛



JI

## 解熱鎮痛薬(散剤)

第②類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気等があらわれることがあります)
- 服用前後は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

## 相談すること



- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の診断を受けた人  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜ ん そ く	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

#### 用法・用量

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上(大人)	1 包	2 回を限度とする
11歳以上15歳未満	2/3 包	
7 歳以上11歳未満	1/2 包	
3 歳以上7 歳未満	1/3 包	
1 歳以上3 歳未満	1/4 包	
1 歳未満	服用しないこと	

なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

#### 成分・分量 1日量（2包）中

アセトアミノフェン……………600mg エテンザミド……………1000mg  
 アリルイソプロピルアセチル尿素…100mg 無水カフェイン…………… 160mg  
 添加物としてタルク、クエン酸Ca、黄色5号、リン酸水素Ca水和物を含有する。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

#### お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室  
 電 話 076 (475) 2121  
 受付時間 9：00～16：00（土、日、祝日を除く）