

フクヤノーカツA

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
承認販売名	フクヤノーカツA
製品名	フクヤノーカツA
製品名（読み）	フクヤノーカツA
製品の特徴	
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b>  <b>〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用しないでください。             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li> </ol> </li> <li>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。              他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬</li> <li>3. 服用前後は飲酒しないでください。</li> <li>5. 長期連用しないでください。</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>(3) 授乳中の人。</li> <li>(4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。</li> <li>(5) 高齢者。</li> <li>(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(7) 次の診断を受けた人。              心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍</li> </ol> </li> <li>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</li> </ol> <p>〔関係部位：症状〕              皮膚：発疹・発赤、かゆみ              消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振              精神神経系：めまい              その他：過度の体温低下</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は</p>

直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称：症状]

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**効能・効果**

(1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛  
(2)悪寒・発熱時の解熱

**効能関連注意**

**用法・用量**

大人（15才以上） 1回1包  
11才以上15才未満 1回2/3包  
8才以上11才未満 1回1/2包  
5才以上8才未満 1回1/3包  
3才以上5才未満 1回1/4包  
3才未満は服用しないでください。  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。  
服用間隔は6時間以上おいてください。

**用法関連注意**

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**成分分量**

2包(2.3g)中	
成分	分量
アセトアミノフェン	600mg
エテンザミド	1000mg
カフェイン水和物	240mg

**添加物**

バレイシヨデンブン、軽質無水ケイ酸、リン酸水素カルシウム

<b>保管及び取扱い上の注意</b>	(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
<b>消費者相談窓口</b>	高市製薬株式会社 奈良県高市郡明日香村野口10 電話：0744-54-2514
<b>製造販売会社</b>	高市製薬株式会社 <u>添付文書情報</u> 奈良県高市郡明日香村野口10
<b>販売会社</b>	
<b>剤形</b>	散剤
<b>リスク区分等</b>	第「2」類医薬品