

解熱鎮痛薬 熱・痛みに、水なしでのめる

小児用バファリン チュアブル

【アセトアミノフェン製剤】

バファリンには有効成分の異なる製品があります。

本品の有効成分はアセトアミノフェンです。アセチルサリチル酸（アスピリン）ではありません。

医師、歯科医師、薬剤師に相談する場合は、アセトアミノフェンとお伝えください。

「小児用バファリンチュアブル」は、3才から15才未満のお子さまの、

熱や痛みを緩和する、胃にやさしい解熱鎮痛薬。水なしでのめるチュアブルタイプです。

主成分アセトアミノフェンがお子さまの急な発熱・痛みをすみやかに緩和します。

お子さまがのみやすいオレンジ味の小粒です。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください

 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害 ぜんそく	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

効 能

- (1) 悪寒・発熱時の解熱
- (2) 歯痛・抜歯後の疼痛・頭痛・打撲痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

用法・用量

なるべく空腹時をさけ服用間隔は4時間以上おき、かみくだくか、口の中で溶かして服用してください。

年 齢	11歳以上 15歳未満	7歳以上 11歳未満	3歳以上 7歳未満	3歳未満
1回量	4錠	3錠	2錠	服用しないこと
1日服用回数	3回を限度とする			

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- (3) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)
- (4) 用法・用量を厳守してください。



成 分 (1錠中)

有効成分	含 量	はたらき
アセトアミノフェン	50mg	熱を下げ、痛みをおさえます。

※添加物として、セルロース、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸Na、トリアセチン、D-マンニトール、クロスポビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリン、アセスルファムカリウム、黄色5号、ステアリン酸Mg、香料、ビタミンEを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先

ライオン株式会社お客様相談室

☎03-3621-6100 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

■ホームページアドレス www.bufferin.net/ 製品についての詳しい情報は、ホームページでもご覧いただけます。

発 売 元:ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

製造販売元:東亜薬品株式会社 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10