

平成19年4月改訂

この説明文書は服用前に必ずお読みください  
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください

医薬品

解熱鎮痛薬

## 新トアノージZ

新トアノージZは解熱鎮痛薬アセトアミノフェン、催眠鎮静薬プロモバレリル尿素、頭痛を和らげる無水カフェインに加え、シャクヤク(芍薬:鎮痛・鎮痙作用)、カンゾウ(甘草:解熱・鎮痙・消炎作用)、ケイヒ(桂皮:鎮痛・鎮痙・発汗作用)の3種の生薬を配合し、からだにやさしく、マイルドに効く解熱鎮痛剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他の解熱鎮痛剤、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

##### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

##### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気が現れることがある)

##### 4. 服用時は飲酒しないこと

##### 5. 長期連用しないこと

#### 相談すること



##### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

##### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症状         |
|-------|------------|
| 皮ふ    | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器   | 恶心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称  | 症状  |
|--|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                     | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(ステイブンス・ジョンソン症候群)<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。           |
| 肝機能障害  | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。                              |

ぜんそく

(2)5~6回服用しても症状が良くならない場合

## 【効能・効果】

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2)悪寒・発熱時の解熱

## 【用法・用量】

次の量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時を避けて服用する。  
服用間隔は4時間以上おくこと。

| 年齢        | 1回量     |
|-----------|---------|
| 15歳以上(大人) | 2カプセル   |
| 7歳以上15歳未満 | 1カプセル   |
| 7歳未満      | 服用しないこと |

### <用法・用量に関する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。
- (3)カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているP.T.Pシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。(アルミ箔がくっついたまま飲み込んだりするとアルミ箔が食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



## 【性状、成分・分量】

新トアノージ乙は次の成分を含有する白色のカプセル剤です。  
1日量6カプセル中

| 成 分 名     | 含 量   | 各 成 分 の 作 用              |
|-----------|-------|--------------------------|
| アセトアミノフェン | 900mg | 痛みの緩和や悪寒・発熱時の解熱に効果があります。 |
| プロモバレリル尿素 | 210mg | 痛みを鎮め、和らげる効果があります。       |
| 無水カフェイン   | 90mg  | 緊張を解き、痛みを和らげる効果があります。    |
| カンゾウ末     | 200mg | 生薬で、解熱、鎮痙、消炎作用があります。     |
| ケイヒ末      | 134mg | 生薬で、鎮痛、鎮痙、発汗解熱作用があります。   |
| シャクヤク末    | 267mg | 生薬で、鎮痛、鎮痙作用があります。        |

添加物：乳糖水和物、ステアリン酸Mgおよびカプセル本体にラウリル硫酸Na、ゼラチン、酸化チタンを含有。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること。
- 2.小児の手の届かないところに保管すること。
- 3.他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)



新トアノージ乙はこんなときに



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

株式会社三九製薬 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話：076-472-1011

受付時間：月～金曜日 9:00～16:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**999 株式会社三九製薬**  
富山県中新川郡上市町若杉55