

第②類医薬品

SHINMOOTOSAN

ずつつ せいりつつ はいた
頭痛・生理痛・歯痛に

新 モートサン

何かとストレスの多い毎日…いろいろな“痛み”に悩まされていませんか？

新モートサンに含まれている

アセトアミノフェン

エテンザミド

カフェイン の3つの成分が協力し合って

あなたの“痛み”を鎮めます。

いつでも、どこでも、飲みやすい、さわやかな細粒状です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないこと
4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある幼・小児(5歳以上15歳未満)。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐・食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息くるしさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群、 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューとなる、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量・はたらき 1日量3包(1.8g)中 1包(0.6g)

成 分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	0.90g	炎症を抑え、頭痛、歯痛、関節の痛みをやわらげ、熱を下げます。
エテンザミド	0.45g	痛みを鎮め、熱を下げます。
無水カフェイン	0.21g	痛みをおさえる成分の働きを助けます。

添加物：乳糖水和物

効 能 ・ 効 果

- (1) 頭痛・歯痛・拔牙後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

用 法 ・ 用 量

次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけ、水又はお湯で服用すること。
服用間隔は4時間以上おくこと

15歳以上	1回	1包	5歳以上7歳未満	1回	1/3包
11歳以上15歳未満	1回	2/3包	5歳未満		服用しないこと
7歳以上11歳未満	1回	1/2包			

(用法・用量に関連する注意)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用すること。

保 管 及 び 取 扱 上 の 注 意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用させること。
- (5) 使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 192 番地

電話番号 0942-92-2303(代)

受付時間 9:00～16:00(土、日、祝日を除く)