

鎮 静 剤

ウツト

第②類医薬品

複雑化する現代社会に伴い、色々なことで神経を使うことが多くなっています。このようなストレスによって、様々な神経症状を引き起こすことが知られています。

ウツトは、精神の興奮や神経衰弱などの鎮静を目的とした薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
4. 服用時は飲酒しないで下さい
5. 過量服用、長期連用しないで下さい

🏠 相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなるない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき

成分及び分量

本品1日量（3錠）中

ブロムワレリル尿素 250mg

アリルイソプロピルアセチル尿素 150mg

塩酸ジフェンヒドラミン 25mg

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有します。

効能又は効果

頭痛、精神興奮、神経衰弱、その他鎮静を必要とする諸症



精神興奮



神経衰弱



用法及び用量

1日1～3回食後に服用して下さい。

年 齢	大人（15才以上）	15才未満
1 回 量	1 錠	服用しないこと


<用法及び用量に関連する注意>

(1) 用法及び用量を厳守して下さい。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)




保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないで下さい。



■お問い合わせ先

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280