

ねむけ
だるさ

カフェイン 200mg 配合

モリピン[®]内服液

第3類医薬品

MORIPIN 30mL

〔使用上の注意〕〔してはいけないこと〕〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕
1.次の人は服用しないでください(1)次の症状のある人
胃酸過多(2)次の診断を受けた人 心臓病、胃潰瘍、2.コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください3.短期間の服用にとどめ、連用しないでください【相談すること】1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください(1)妊婦又は妊娠していると思われる人(2)授乳中の人2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、悪心・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
そ の 他	どうき

〔適応症〕ねむけ・倦怠感の除去

〔用法・用量〕成人(15才以上)1日1回1びん(30mL)を服用してください。●1日2回以上の服用は避けてください。●15才未満は服用しないでください。

〔成分〕1びん(30mL)中 カフェイン水和物…200mg・L-リジン塩酸塩…100mg・コンドロイチン硫酸ナトリウム…120mg・タウリン…500mg・ニコチン酸アミド…20mg・パントテン酸ナトリウム…30mg・チアミン塩化物塩酸塩…10mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム…2mg・ピリドキシン塩酸塩…1mg 添加物：クエン酸、クエン酸Na、L-グルタミン酸Na、カラメル、白糖、ブドウ糖、安息香酸Na、バラベン、香料(アルコール0.15mL以下)

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用
期限

製造
番号



製造販売元
森田薬品工業株式会社
広島県福山市大門町野々浜1059番地
電話 (084) 943-8171

本社 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

ガラス：びん
金 属：キャップ

A811M1K

4 961420 139373