

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

のりもの酔いに **こどもクールスカイ®** 鎮暈薬 〈内服液〉 **第2類医薬品**

こどもクールスカイは、お子様用ののりもの酔い予防・治療薬です。液剤なので有効成分が早く吸収され、めまい、はきけ、頭痛などの不快な症状に効果をあらわします。

△[使用上の注意]

❌してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。]

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他ののりもの酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）。

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人：排尿困難。
- (6) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	皮膚	精神神経系	循環器	泌尿器	その他
症状	発疹・発赤、かゆみ	頭痛	動悸	排尿困難	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	再生不良性貧血	無顆粒球症
症状	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれます。	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれます。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ。

【効能・効果】

のりもの酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和。

【用法・用量】

3～14才、1回1本(20mL)を服用してください。のりもの酔いの予防には乗車船30分前に1回1本を服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1本を4時間以上の間隔をおいて服用してください。1日の服用回数は2回を限度とします。3才未満の乳幼児には服用させないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

有効成分	含有量 (40mL, 2本中)	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.667mg	はきけ、めまいをおさえます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.167mg	はきけ、めまいをおさえます。
無水カフェイン	25mg	頭痛を軽くします。

添加物として、安息香酸Na、エタノール、クエン酸、グリセリン、香料、D-ソルビトール、白糖、プロピレングリコールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。

～ のりもの酔いをさけるための注意 ～


のりもの酔いをさけるために、次の点にも注意してください。



- のりものに乗る前夜は睡眠を十分にとりましょう。



- 揺れが少ない前方の席や窓際の席を選びましょう。



- おしゃべりで気分を楽にしましょう。



- 飲み過ぎ食べ過ぎはさけましょう。

▼本品品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発 売 元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
<http://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室 ☎ 0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元  **田村薬品工業株式会社** 〒639-2295 奈良県御所市西寺田50