

こどもレジャー液[®]

特徴

こどもレジャー液は、ミックスフルーツ味のドリンクタイプなので大変服用しやすく、お子様の乗物酔いによる不快な症状を予防し、緩和します。



使用上の注意

本剤は、小児用ですが、乗物酔い薬として定めた一般的な注意事項を定めています。



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき、便秘

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】

乗物酔いの予防には、乗車船30分から1時間前に次の1回量を服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
7才以上15才未満	1 ビン	4時間以上の間隔を置いて2回まで
7才未満	服用しないこと	

その後必要な場合には、1回量を4時間以上の間隔を置いて服用すること。
なお、1日の服用回数は2回までとして下さい。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】

1回量（1ビン 10mL）中

分 類	成 分	含 量	は た ら き
抗アセチルコリン剤	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.125mg	乗物酔いにおける吐き気、めまい等の症状を緩和し、予防します。
中枢興奮剤	無水カフェイン	25mg	乗物酔いからくる頭痛に対し緩和し、予防します。
ビタミン剤	ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	10mg	乗物酔いにおける吐き気等の症状を緩和し、予防します。

添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【乗物酔いをさけるための注意】

★乗物酔いをさけるために、次の点にもご注意下さい。

前日は睡眠をよくとりましょう。	胃に長く残るものはなるべく食べない様にしましょう。	体をしめつける様な服はやめましょう。	乗物の中では、本は読まない様にしましょう。	「決して乗物に酔わない」と思う様に心掛けましょう。
-----------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社 製造販売元 牛津製薬株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16 佐賀県小城市牛津町下砥川-2