

乗物酔い薬

この説明書は、本剤とともに保管し、
服用の際には、必ずお読みください。

©

乗物酔いによるはきけ・めまいに

持続性製剤

アネロン「ニスキャップ」[®]

ANERON NYSCAPS

アネロン「ニスキャップ」は、はきけ・めまい・頭痛といった乗物酔いに伴う症状の予防・改善にすぐれた効果をあらわす持続性のカプセル剤です。



特長

○乗物酔いを予防します

効果が長く続くように工夫された持続性製剤ですから、1日1回の服用で、安定した効きめをあらわし、乗物酔いを予防します。

○乗物酔いの症状を改善します

乗車船中に乗物酔いが起きた場合でも、はきけ・めまい・頭痛といった症状をすみやかに改善します。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

15才未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

心臓病、緑内障

(裏面につづく)

®：登録商標

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき、下痢

効能・効果

乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛の予防および緩和

用法・用量

次の1回量を1日1回服用します。ただし、乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1カプセル	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

○用法・用量を厳守してください。

成 分 1カプセル中

マレイン酸フェニラミン 30mg アミノ安息香酸エチル 50mg
スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.2mg 無水カフェイン 20mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 5mg

添加物として、二酸化ケイ素、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、トウモロコシデンプン、メタクリル酸コポリマー-L、ラウリル硫酸Na、ビタミンB₂、赤色3号、黄色5号、青色1号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

乗物酔いの予防には

- 1.バス・船・飛行機などに乗る前夜は、睡眠不足にならないよう気をつけましょう。
- 2.消化のよい食物を適度に食べ、胃腸の調子を整えましょう。
- 3.座席はなるべく揺れの少ない場所に、姿勢を楽にしてゆったりとすわりましょう。
- 4.窓から遠くの景色を眺めたり、おしゃべりやゲームなどで気分をまぎらわしましょう。
- 5.乗物酔いの薬は、あらかじめ服用しておく方が効果的です。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>