

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

水なしでサッと溶ける／酔ってからでも効く

センバアQT

販売名:センバア・QT 第2類医薬品 〈乗物酔い薬〉

- ◆センバア・QTは、**水なしでかまずにすばやく溶けるタイプ**の乗物酔い止め薬です。
- ◆乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和します。
- ◆気分が悪くなってからでもすぐに服用すれば、めまい・吐き気・頭痛をしずめます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
- 2 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)



相談すること

- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ



効 能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



めまい



吐き気



頭痛

用法・用量

次の量を口中で溶かして服用してください。
乗物酔いの予防には乗車船30分前に1回1錠を服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1錠を4時間以上の間隔をおき服用してください。

年 令	1回量	服用回数
15才以上	1錠 	1日2回まで
15才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているアルミ包装シートのフタ部を上に向け、そのはがし口(赤い部分)を指先でつまみ、ゆっくり引きはがした後、錠剤を下から押し上げ、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

とり出し方



赤い部分をはがし
下から押しとり
出してください。

- (3) 錠剤が割れないよう、注意して包装シートから取り出してください。
- (4) めれた手等で直接さわらないようにしてください。
(水にたいへん溶けやすい錠剤です)

成 分

1錠中

成 分	分 量	はたらき
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg	嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気・頭痛をおさえます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.25mg	自律神経の興奮状態を緩和し、めまい・吐き気をおさえます。

添加物：ゼラチン、D-マンニトール、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、ビタミンE

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



乗物酔いをさけるために、次の点にもご注意ください

前夜は十分な睡眠を心がけましょう。



気分よくすごしやすい、前方の席や窓際の席を選びましょう。



飲み過ぎや食べ過ぎはさけましょう。



適度なおしゃべりで気分よくすごしましょう。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)