

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

乗物酔い薬

ヨイテック®ワンデイ

第②類医薬品



《使用上の注意》



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

排尿困難

- (7) 次の診断を受けた人。

緑内障、心臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき、便秘

効能又は効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法及び用量

下記の量を1日1回服用して下さい。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分前に服用して下さい。

年 齢	1 回 量
15才以上	1錠
7才以上15才未満	1／2錠
7才未満の小児	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分及び分量

1錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
塩酸メクリジン	30mg
スコボラミン臭化水素酸塩水和物	0.1mg
無水カフェイン	20mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	15mg

添加物としてD-マンニトール、バレイシヨデンブ、セルロース、クロスCMC-Na、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、バニリン、青色1号を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地