

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

乗物酔い薬

ヨイラック®ワンデイ

第②類医薬品



《使用上の注意》



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）高齢者。
 - （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （5）次の症状のある人。 排尿困難
 - （6）次の診断を受けた人。 緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能又は効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法及び用量

下記の量を1日1回服用して下さい。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分前に服用して下さい。

年 齢	1 回 量
15才以上	1錠
7才以上15才未満	1/2錠
7才未満の小児	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分及び分量

1錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
塩酸メクリジン	30mg
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.1mg
無水カフェイン	20mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	15mg

添加物としてD-マンニトール、バレイショデンプン、セルロース、クロスカルメロースNa、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、バニリン、青色1号を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地