

この添付文書は、お薬とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読み下さい。

【漢方薬】  
**強 悪 阻 散**

◆ 強悪阻(オソ)散は、金匱要略きんぎようりゃくという書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の散剤です。

**⚠ 使用上の注意**



**相談すること**

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
  - 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

**効能・効果**

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和  
つわりによる諸症状(食欲不振、吐き気、嘔吐など)の緩和

**用法・用量**

次の量をコップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。  
服用間隔は4時間以上おいて下さい。

| 年 齢        | 1回量            |        | 1日服用回数 |
|------------|----------------|--------|--------|
|            | 容器入りの場合        | 分包品の場合 |        |
| 大 人        | 1.5g(添付のサジ1杯)  | 1包     | 3回     |
| 11歳以上15歳未満 | 大人の2/3の量(1.0g) | 2/3包   |        |
| 11歳未満      | 服用しないこと        |        |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

**成分・分量**

本剤4.5g又は3包中

ショウキョウ……0.616g } エキス……3.691mL(固形物として0.158g)  
ハ ン ゲ……1.139g }

プクリョウ末……………3.887g

添加物としてバレイシヨデンブンを含有する。

- ・本剤は淡黄白色で、特異なおいを有し、味はわずかに辛い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強悪阻散は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1