

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮 吐

(生薬製剤)



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 高齢者
 - 次の症状のある人
むくみ
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血 圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

つわり、嘔吐、しゃっくり

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15 歳 未 満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。

成分・分量

本品3包（1包2.0g）中、下記生薬より製した水製乾燥エキス2.15gを含有します。

ハ ン ゲ	1.67g	オ ウ レ ン	1.67g
キ ジ ッ	1.67g	コ ウ ブ シ	1.67g
サ イ シ ン	1.67g	カ ン ソ ウ	1.67g
ブ ク リ ヨ ウ	1.67g	チ ン ピ	1.67g
カ ッ コ ウ	1.67g	ケ イ ガ イ	1.67g

添加物として乳糖及びカルメロースナトリウムを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7