

*：2008年3月に改訂しました

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【神経痛・リウマチ用生薬製剤】

ロイルック錠

- ◆ ロイルック錠は、神経痛・リウマチ・関節痛・筋肉痛などの痛みを改善するために考え出された生薬製剤です。
- ◆ ロイルック錠中のカンゾウ・キョウカツ・チンピ・ビャクシ・ボウイ・ボウフウ・リュウタンなどは神経痛・リウマチなどの痛みを和らげるように働きます。トウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウ・トウニン・ブクリョウ・ソウジュツ・ゴシツなどは神経痛・リウマチ・関節痛・筋肉痛などの状態が回復するように手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

リウマチ、神経痛、関節痛、筋肉痛、打撲痛

*用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15 歳以上)	5錠	3回
15 歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守すること。

*成分・分量

本剤15錠(5.175g)中

カ ン ゴ ウ0.05g・ゴ シ ツ 0.5g・ジ オ ウ0.7 g・シ ャ ク ヤ ク0.8 g
シ ョ ウ キ ョ ウ0.05g・セ ン キ ュ ウ 0.7g・ソ ウ ジ ュ ツ0.05g・チ ン ビ0.1 g
ト ウ キ 0.7 g・ト ウ ニ ン 0.2g・ビ ャ ク シ0.2 g・ブ ク リ ョ ウ0.05g
ボ ウ イ0.5 g・ボ ウ フ ウ 0.5g・リ ュ ウ タ ン 0.05g・イ レ イ セ ン 0.3 g
キ ョ ウ カ ツ0.5 g

カ ン ゴ ウ 末……0.9g、シ ョ ウ キ ョ ウ 末……0.1 g、ソ ウ ジ ュ ツ 末……1.3 g
ブ ク リ ョ ウ 末……1.4g、リ ュ ウ タ ン 末……0.05g、チ ン ビ 末……0.05g

エキス
…0.7g

添加物として黄色5号、カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ステアリン酸
マグネシウム、乳糖、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース2910を含有する。

- ・本剤は灰黄赤色で、特異なおいを有し、味は初めなく後辛いフィルムコート錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがありますが、
効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 錠剤に水分が付くと、表面のフィルムコートが溶けることがありますので、誤って水滴を
おとしたり、ぬれた手で触れないようにして下さい。

薬と養生

ロイルック錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服
用することが大切です。
また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大
事なことです。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いた
だいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、
又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1