

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

再春 痛散湯 エキス顆粒

第②類医薬品

(30日分)
1.5g×90包

生薬処方の神経痛・リウマチ・肩痛・筋肉痛・関節炎薬
(発熱して、諸関節や各処の筋肉が腫れて痛むもの)顆粒剤

中国の漢方の古典「金匱要略」に記載されている
「麻杏薏甘湯」に防已を加えた再春館独自の処方

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (5) 胃腸の弱い人
 - (6) 発汗傾向の著しい人
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 高齢者
 - (9) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (10) 次の症状のある人 むくみ、排尿困難
 - (11) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
 - (12) 薬（特に医師、歯科医師から処方された医薬品）を使用している人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
肝 臓	発熱、全身のだるさ 尿の色が濃くなる（黄褐色～赤褐色）

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

3. 3ヶ月くらい服用しても症状の改善が見られない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能又は効果

発熱して、諸関節や各処の筋肉が腫れて痛むものの次の諸症
神経痛、リウマチ、肩痛、筋肉痛、関節炎

■用法及び用量

次の量を1日3回随時服用してください。

年齢	1回量
大人（17才以上）	1包（1.5g）
17才未満7才まで	大人の1/2量
7才未満4才まで	大人の1/3量
4才未満	服用しないでください

＜用法及び用量に関連する注意＞

1. 定められた用法及び用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分及び分量

大人1日量3包（4.5g）中

水製乾燥エキス……………0.5g

〔マオウ0.7g・キョウニン0.5g・ヨクイニン1.3g・カンゾウ0.5g〕
〔ボウイ2.0g・動物胆0.1gより製したエキス〕

マオウ……………0.6g

ヨクイニン末……………1.4g

カンゾウ末……………0.4g

ボウイ末……………1.6g

＜成分及び分量に関連する注意＞

本剤は生薬（薬用の草根木皮）から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色、風味が異なることがございますが、品質には変わりありません。

■保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ご相談及びお問い合わせ

1. 本品についてのお問い合わせは下記のフリーダイヤルへご連絡ください。
(1)お電話でのお問い合わせ（午前8時から午後10時まで受付）
☎TEL 0120-305-305
(2)FAXでのお問い合わせ（24時間受付）
☎FAX 0120-444-104
2. 当社では薬剤師又は登録販売者が常駐しておりますので、ご相談ください。

製造販売元



株式会社 再春館製薬所

熊本県上益城郡益城町寺中1363-1