

第3類医薬品

液剤タイプ



Laxative & Antacid (Suspension)

販売名:ミルマグ液

服用に際しては、このボトルの表示をよくお読みください。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないこと

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人 (4)腎臓病の診断を受けた人

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このボトルを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 消化器:はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3.服用後、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このボトルを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4.便秘治療薬として1週間位又は制酸剤として2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このボトルを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

【成分】100mL中
水酸化マグネシウム12g含有
添加物としてクエン酸水和物含有

飲み方

本剤を逆さまにし、均一になるようよく振り混ぜ、添付の計量カップで必要量を量り、コップ1~2杯の水に薄め服用する。便秘治療薬としては水分を多く摂取するとより効果的。※計量カップの目盛は目安。

便秘治療薬として用いる場合

【効能・効果】

○便秘 ○便秘に伴う次の諸症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	5~17mL	1回
11才以上15才未満	3~11mL	就寝前(又は空腹時)に服用すること
7才以上11才未満	3~8mL	
3才以上7才未満	2~5mL	服用しないこと
3才未満		

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

制酸剤として用いる場合

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3mL	3回
8才以上15才未満	2mL	食後1~2時間後又は就寝前に服用すること
5才以上8才未満	1mL	
5才未満		服用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守すること
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (3)添付の計量カップは使用后、洗って清潔に保管すること

お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1



<使用期限、製造番号> ボトル底に記載